

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

太平惠民和劑局方卷六

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣左顥若

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方卷六

宋

陳師文等

撰

治積熱

紫雪療脚氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂易叫走
瘴疫毒病卒死溫瘥五尸五疰心腹諸疾疔刺切痛及
解諸熱藥毒發邪熱卒黃等并解蠱毒鬼魅野道熱毒

石膏

黃金

一百兩

寒水石

磁石

以上四味各三斤搗碎水一斛煮至四斗去渣

入下項

犀角屑

羚羊角屑

青木香

搗碎

沉香

搗碎各五兩

玄參

洗焙搗碎

升麻

各一斤

甘草

剉炒八兩

丁香

一兩搗碎

以上八味入前藥汁中再煮取一斗五升去渣

入下項

朴硝

精者十斤

硝石

四升如關芒硝亦得每升重七兩七錢半

以上二味入前藥汁中微火上煎柳木篦攪不

住手候有七升投在木盆中半日欲凝入下項

麝香當門子

一兩二錢半
研

硃砂

飛研三兩

以上二味入前藥中攪調令勻寒之二日

右件藥成霜雪紫色每服一錢或二錢用冷水調下

大人小兒臨時以意加減食後服

紅雪通中散治煩熱黃疸脚氣溫瘴解酒毒消宿食開
三焦利五臟爽精神除毒熱破積滯去腦悶治眼昏頭
痛鼻塞口瘡重舌腸癰喉閉及傷寒狂躁胃爛發斑等

病並宜服之

赤芍藥

枳殼

去穰麩炒黃

檳榔

人參

去蘆

淡竹葉

甘草

生用

木香

各二兩

羚羊角屑

升麻

黃芩

各三兩

梔子

去皮

葛根

桑白皮

木通

大青

去根

藍葉

各一兩半

川朴硝

十斤

蘇枋

六兩

硃砂

細研一兩

麝香

細研半兩

右藥除硃砂麝香外並細剉以水二斛五升煎至九

升去渣更以綿濾過再以緩火煎令微沸然後下朴

消以桺木毘攪勿住手候凝次下硃砂麝香等末攪
令勻頓新瓷盆中經宿即成矣細研每服一錢至二
錢新汲水調下更量老小虛實臨時加減服凡服靈
寶丹者先依上件服法調此藥服訖須臾更以熱茶
投令宣瀉一兩行為度後依法服靈寶丹立效

涼膈散治大人小兒腑藏積熱煩躁多渴面熱頭昏脣
焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄頰頰結硬口舌生瘡疾實
不利涕唾稠粘睡卧不寧譫語狂妄腸胃燥澁便溺秘

結一切風壅並宜服之

川大黃

朴硝

甘草

煨各二十兩

山梔子仁

薄荷葉

去梗

黃芩

各十兩

連翹

二斤半

右粗末每二錢水一盞入竹葉七片蜜少許煎至七

分去渣食後溫服小兒可服半錢更隨歲數加減服

之得利下住服

洗心散治風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱

氣上衝口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾稠粘心神

煩躁眼溢睛疼及寒壅不調鼻塞聲重咽乾多渴五心煩熱小便赤澁大便秘滯並宜服之

白朮

一兩半

麻黃

去節

當歸

去苗洗

荊芥穗

芍藥

甘草

炙

大黃

麴裏煨去麴切焙各六兩

右為細末每服二錢水一盞入生薑薄荷各少許同煎至七分溫服如小兒痘豆瘡疹欲發先狂語多渴及驚風積熱可服一錢並臨卧服如大人五藏壅實欲要溘轉加至四五錢乘熱服之

八正散治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥大渴引飲心忪面熱煩躁不寧目赤睛疼唇焦鼻衄口舌生瘡咽喉腫痛又治小便赤澁或癰閉不通及熱淋血淋並宜服之

車前子

瞿麥

扁蓄

亦名地扁竹

滑石

山梔子

仁

甘草

炙

木通

大黃

麩裹煨去

麩切焙

各一斤

右為散每服二錢水一盞入燈心煎至七分去渣溫

服食後臨卧小兒量力少少與之

龍腦飲子治大人小兒蘊積邪熱咽喉腫痛赤眼口瘡
心煩鼻衄咽乾多渴睡卧不寧及除痰熱欬嗽中暑煩
躁一切風壅並宜服之

縮砂仁

括萎根 各三兩

霍香藥

二兩
四錢

石膏 四兩

甘草 蜜炒十六兩

大梔子仁

微炒

十二兩

右為末每服一錢至二錢用新水入蜜調下又治傷

寒餘毒潮熱虛汗用藥二錢水一盞入竹葉五六片煎至七分溫服並食後服

妙香丸治丈夫婦人時疾傷寒解五毒治潮熱積熱及小兒驚癇百般等病並皆治之

巴豆 三百一十五粒去皮心膜炒熟研

牛黃 研

龍腦 研

膩粉 研

麝香 研各三兩

辰砂 飛研九兩

金箔 研九十箔

右合研勻煉黃蠟六兩入白沙蜜三分同煉令勻為

丸每兩作三十丸如治潮熱積熱傷寒結胸發黃狂
走燥熱口乾面赤大小便不通煎大黃炙甘草湯下
一丸毒利下血煎黃連湯調膩粉少許如患酒毒食
毒茶毒氣毒風疾伏痞吐逆等並用膩粉龍腦米飲
下中毒吐血悶亂煩躁欲死者用生人血下立愈小
兒百病驚癇急慢驚風涎潮搐搦用龍腦膩粉蜜湯
下菴豆大二丸諸積食積熱類赤煩躁睡卧不寧驚
哭瀉利並用金銀薄荷湯下更量歲數加減如大人

及婦人因病傷寒時疾陰陽氣交結伏毒氣胃中喘躁眼赤潮發不定再經日數七八日已下至半月日未安醫所不明證候脉息交亂者可服一九或分作三丸亦可並用龍腦膩粉米飲調半盞已來下此一服取轉下一切惡毒涎并藥丸瀉下如要却收水洗淨以油單子裏埋入地中五日取出可再與大人小兒依法服一九救三人即不堪使如要藥速行即用針刺一眼子冷水浸少時服之即效更速

龍腦雞蘇丸除煩解勞消殺下氣散胸中鬱熱主肺熱
欬嗽治鼻衄吐血血崩下血血淋熱淋勞淋氣淋止消
渴除驚悸涼上膈解酒毒又治胃熱口臭肺熱喉腥脾
疸口甜膽疸口苦常服聰耳明目開心益智

柴胡

要真銀州者二兩判同末通以沸湯大半升浸一二宿絞汁后入膏

阿膠

炒微燥

木通

判同柴胡浸

蒲黃

真者微炒

人參

各二兩

黃芪

去蘆一兩

雞蘇

淨藥一斤即龍腦薄荷也

麥門冬

湯浸去心焙四兩

甘艸

炙一兩

生乾地黄末

六兩後入膏

右除別研藥后入外並搗羅為細末將好蜜二斤先
煉一二沸然後下生乾地黄末不住手攪時時入絞
下者木通柴胡汁慢慢熬成膏勿令焦然后将其餘
藥末同和為丸如豌豆大每服二十九丸嚼破熟水下
不嚼亦得虛勞煩熱消渴驚悸煎人參湯下欬嗽吐
血鼻衄吐血將麥門冬湯浸去心煎湯下并食后臨
卧服之性血崩下血諸淋疾皆空心食前服治淋用

車前子湯下

牛黃涼膈丸治風壅痰實蘊積不散頭痛面赤心煩潮
躁痰涎壅塞咽膈不利精神恍惚睡卧不安口乾多渴
唇焦咽痛頰頰赤腫口舌生瘡

牛黃

研一分一兩一分

南星

牛胆製七兩半

甘草

燼十兩

麝香

研

紫石英

研飛

龍腦

研各五兩

牙硝

枯過研細

寒水石粉

煨

右為末煉蜜為丸每兩作三十九每服一九溫薄荷

人參湯嚼下食后服小兒常服半丸治急驚一丸並用薄荷水化下

抱龍丸治風壅痰實頭目昏眩胃膈煩悶心神不寧恍惚驚悸痰涎壅塞及治中暑煩渴陽毒狂躁

雄黃

研飛四兩

白石英

研飛

生犀角

麝香

研

硃砂

研飛各一兩

藿香藥

二兩

天南星

牛胆製十六兩

牛黃

研半兩

阿膠

碎硃如珠三兩

金箔

研

銀箔

研各五十片

右件為細末入研諸藥令勻用溫湯漉和為丸如雞
頭實大每服一九用新汲水化破入鹽少許服食後
甘露丸治大人小兒風壅痰熱心膈煩躁夜卧不安譫
語狂妄目赤鼻衄口躁咽乾療中暑解熱毒

鉛白霜

龍腦

各三分

牙硝

括過三兩

甘草

炙一兩

寒水石粉

三十二兩

右為細末用糯米糊丸如彈子大每服用生薑蜜水
磨下半丸新汲水亦得小兒一九分五服食後

欽定四庫全書

太平廣記卷之六

九

甘露飲治丈夫婦人小兒胃中客熱牙宣口氣齒齲腫爛時出膿血目臉垂重常欲合閉或頻饑煩不欲飲食及赤目腫痛不任涼藥口舌生瘡咽喉腫痛瘡疹已發未發皆可服之又療脾胃受濕瘀熱在裏或醉飽房勞濕熱相搏致生疸病身面皆黃肢體微腫胸滿氣短大便不調小便黃澁或時身熱並皆治之

枇杷葉

刷去毛

乾熟地黄

去土

天門冬

去心焙

枳殼

去穰麩炒

山茵陳

去梗

生乾地黄

麥門冬 去心焙

石斛 去蘆

甘草 炙

黃芩

右等分為末每服二錢水一盞煎至七分去渣溫服
食後臨卧小兒一服分兩服仍量歲數加減與之

桂苓丸消暑丸治證并方傷寒中暑類

五淋散治腎氣不足膀胱有熱水道不利通淋瀝不宜
出少起多臍腹作痛蓄作有時勞倦即發或尿如豆汁
或如砂石或冷淋如膏或熱淋便血並皆治之

又方見後

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方卷六

白茯苓

六兩

當歸

去蘆

甘草

生用各五兩

山梔子仁

各二十兩

赤芍藥

去蘆判

右為細末每服二錢水一盞煎至八分空心食前服

消毒麻仁九治諸般風氣上壅久積熱毒痰涎結實胸膈不利頭旋目運或因酒麪炙烤毒食所傷停留心肺浸漬腸胃蘊蓄不散久則內鬱血熱腸風五痔外則發瘡癰瘍瘡赤斑遊腫渾身躁悶面上瘡赤口乾舌裂咽嗑澀痛瘡中引飲或傷寒時變口鼻出血煩躁者及風

毒下疳瘡腫疼痛脚氣衝心悶亂一切風熱毒氣並皆
主之

杏仁

生去皮尖
二兩

大黃

生五兩

山梔子仁

十兩

右三味煉蜜為丸每服三十九至五十九夜卧溫湯
吞下利下赤毒膠涎為效服時隨意加減此藥穩甚
善不損藏府常服搜風順氣解毒治小兒驚熱以蜜
湯化下三五丸極效

導亦散治大人小兒心經內虛邪熱相乘煩躁悶亂傳

流下經小便赤澁淋澁臍下滿痛

生乾地黄

木通

甘草

生各等分

右咬咀每服三錢水一盞竹葉少許同煎至六分去
查溫服不拘時候

三黃丸治丈夫婦人三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤
腫頭項腫痛口舌生瘡中

下焦有熱小便赤澁大便秘結五藏俱熱即生瘡癰瘡
瘕及治五般痔疾糞門腫痛或下鮮血

黃連

去毛蘆

黃芩

去蘆

大黃

煨各十兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九用熟水吞下如藏府壅實加服丸數小兒積熱亦宜服之消毒犀角飲治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核癰腫聚遍身風疹癰毒赤癰及瘡疹已出未出不能快透並皆治療小兒疹豆欲出及已出熱未解急進此藥三四服快透消毒應手神效

防風

去叉枝八兩

鼠粘子

炒六十兩

甘草

炙十六兩

荊芥穗 二斤

右為粗末每服三錢水一盞煎至七分去查食後溫

溫服之

碧雪治一切積熱咽喉腫痛口舌生瘡心中煩躁嚙物妨悶或喉閉壅塞水漿不下天行時疫發狂昏憤並皆治之

芒硝

青黛

寒水石

研飛

石膏

煨過研飛

朴硝

消石

馬牙硝

甘草

各等分

右將甘草煎湯二升去渣却入諸藥再煎用柳木篦
不住手攪令消鎔得所却入青黛和勻傾入砂盆內
候冷結凝成霜研為細末每用少許含化嚥津不拘
時候如喉閉壅塞不能嚥物者即用小竹筒吹藥入
喉中頻用神效

勝水丹治三焦壅盛上衝頭目赤熱疼痛口舌生瘡咽
喉不利嚥物有礙神思昏悶並皆治之

白藥子 一兩半

紅內消

黃藥子

甘草

炙

山豆根

黃連

各二兩

麝香

研

龍腦

研各二錢

右為末用建饅盛於飯上蒸候冷入腦麝令勻煉蜜
丸如雞頭大每一丸含化又用津唾於指甲上磨少
許點赤眼立效

導赤丸治心腎凝滯膀胱有熱小便不通風熱相搏淋
瀝不宣或服補藥過多水道塞澁出少起數臍腹急痛
攻注陰間或心肺壅熱面赤心忪口乾煩渴及癰腫發

背血脉瘀閉服此排膿內消腫毒疎導心經邪熱應內
蘊風熱五般淋疾並皆治之

赤芍藥

茯苓

去皮

滑石

各四兩

大黃

炒十五兩

山梔子

炒二十兩

生乾地黃

焙

木通

去節各半斤

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九至三

十丸食後用溫熟水吞下

五淋散治證與前五淋散同

木通

去節

滑石

甘草

炙各六兩

茯苓

去皮

赤芍藥

各半斤

山梔仁

炒十四兩

淡竹葉

四兩

茵陳

去根日乾二兩

右搗羅為末每服三錢水一盞至八分空心服

麥門冬散治丈夫婦人蘊積邪熱心胃煩悶咽乾口燥睡卧不安或大小腸不利口舌生瘡並皆治之

小草

去心

黃連

去鬚

升麻

去粗皮

犀角屑

甘草

炙

枳殼

去穢炒黃

黃芩

大青

去根各半兩

芒硝

一兩

麥門冬

去心三分

右為細末每服三錢水一盞煎至七分食後溫服

真珠散治丈夫婦人五藏積熱毒氣上攻心胃煩悶口乾舌燥精神恍惚心忪悶亂坐卧不寧並宜服之

琥珀

真珠粉

寒水石

服醋淬研

鐵粉

硃砂

研飛

甘草末

生

川大黃

牙硝

枯研

括婁根末

右等分各搗為末拌勻每服一錢以竹葉湯溫調下
不拘時

靈液丹治一切風熱藏腑積熱毒氣上攻胃膈煩躁口
舌乾澀心神壅悶咽嗑不利飲食無味並皆治之

烏梅

去核炒

寒水石

火煨研飛

括萎根

石膏

研

葛根

赤茯苓

各一兩半

麥門冬

去心焙一兩半

龍腦

別研一錢

右搗羅為末入研藥令勻煉蜜丸如彈子大每服一
丸薄綿裹含化嚥津

治瀉痢

附秘澁

鍾乳健脾丸治男子婦人虛損羸瘦身體沉重脾胃
冷弱飲食不消腹脹雷鳴泄瀉不止又治腸虛積冷下
痢清穀或純下白腹中疴痛及久痢赤白腸滑不禁少
氣羸弱困不思飲食並宜服之

肉桂

去粗皮

人參

黃連

去鬚

乾薑

炮

龍骨

當歸

去蘆

石斛

去根

大麥蘖

炒

茯苓

細辛

去苗土

神麴

碎炒各二兩

赤石脂

煨二兩

蜀椒

去目及閉口者微炒出汗六兩

附子

炮去皮臍一兩

鍾乳粉

三兩

右為細末入鍾乳粉勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸溫米飲下食前日三服

朝真丹治腸胃虛弱內受風冷或飲食生冷內傷脾胃泄瀉暴下日夜無度腸鳴腹痛手足厥寒

硫黃

生研細三十兩

硃砂

研為衣三兩一錢

白礬

煨七兩半

右令研勻用水浸蒸餅為丸如梧桐子大以前硃砂
為衣每服三十九溫米飲下不計時候夏月宜備急
駐車丸治一切下痢無問新久及冷熱膿血腸滑裏急
日夜無度臍腹絞痛不可忍者

阿膠

搗破炒如珠子為末以醋四
升熬成膏

當歸

去蘆各
十五兩

黃連

去毛三十
兩

乾薑

炮十兩

右為細末以阿膠膏和併手丸如梧桐子大每服三
十九食前溫米飲下日三服凡小兒服如麻子大更

量歲數加減

訶梨勒丸治腸胃虛弱內受風冷水穀不化泄瀉注下
腹痛腸鳴胸滿短氣又治腸胃積寒久利純白或有青
黑日夜無度及脾胃傷冷暴瀉不止手足逆冷脉微欲
絕並宜服之

訶梨勒皮

川烏頭炮去皮
臍

縮砂仁

白礬

煨四十
兩

肉豆蔻

去皮炮

木香

乾薑

炮各二十
兩

龍骨

洗

赤石脂

各八十
兩

右為末用粟米飲為丸如梧桐子大每服二十九至
三十九溫粟米飲下食前服甚者可倍加丸數

大溫脾丸治脾胃虛弱冷氣攻衝飲食不化心腹脹痛
嘔吐吞酸痞噎不通腸鳴泄利水穀不分面黃肌瘦食
減嗜卧並皆治之常服溫脾益胃消穀飲食如久虛痼
冷食少多傷尤宜常服

吳茱萸

湯七次
焙

大麥蘖

炒

肉桂

去粗皮
各五兩

甘草

炙

桔梗

人參

乾薑

炮各三兩

附子

炮去皮臍

細辛

去苗各二兩

神麴

碎炒三兩一錢

枳實

麴炒一分半

右為細末煉蜜和為丸如梧桐子大每服二十九溫酒下米飲亦得日三服空心食前

黃連阿膠丸治腸胃氣虛冷熱不調下利赤白狀如魚腦裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利

阿膠

碎炒一兩

黃連

去毛三兩

茯苓

去皮二兩

右黃連茯苓搗為細末水調阿膠末溲和丸如梧桐

子大每服二十九溫水飲下食前服

神效胡粉丸治腸胃虛滑下利無度赤白相雜臍腹痛裏急後重減食羸瘦或經久未差並宜服之

胡粉

烏魚骨

阿膠

炒焦如珠子四

十兩

白礬

煨

龍骨

洗各八兩

蜜陀僧 二十兩

右為末以粟米飯為丸如梧桐子大每服二十九至三十九溫粟米飲空心下

桃花丸治腸胃虛弱冷氣乘之臍腹攪痛下利純白或冷熱相搏赤白相雜腸滑不禁日夜無度

赤石脂

乾薑

炮各等分

右為末水麴糊為丸如梧桐子大每服三十丸溫米飲送下空心食前日三服

靈砂丹治藏府怯弱內有積滯臍腹撮痛下利膿血日夜無度裏急後重腸鳴腹脹米穀不化少氣困倦不思飲食或發寒熱漸至羸瘦

硝石

與砒一處細研入磁罐子內用石炭盡口炭火燒半日取出去火毒

信州砒霜

膩粉

研

粉霜

研各半兩

黃丹

研

枯礬

研各一兩半

硃砂

研飛一兩

乳香

研

桂府滑石

各一分

右件藥研羅為末用蒸餅二兩四錢和為丸如梧桐子大每服五丸溫粟米飲下未愈加丸數再服小兒可服一九至二九隨大小臨時增減服之

不二九治大人小兒一切瀉利無問冷熱赤白連綿不

差愈而復發腹中疼痛者宜服之

巴豆

去皮心膜
去油

杏仁

浸去皮尖研
各七十個

黃蠟

一兩三錢

砒霜

研入磁罐子以赤石脂固縫鹽泥固濟燒通
赤候冷取出一兩六錢

白膠香

研細四錢

黃丹

研二兩半

乳香

研大錢半

硃砂

研飛半兩

木鼈子

燒焦十個

右合研勻鎔蠟和丸如黃米大每錢作一百二十九

每服一丸小兒半丸水瀉新汲水下赤利甘草湯下

白利乾薑湯下赤白利甘草乾薑湯下並放冷臨卧

服忌熱物一二時辰

訶梨勒散治脾胃虛弱內挾冷氣心脇臍腹脹滿刺痛
嘔吐惡心飲食減少腸鳴泄利水穀不化怠惰少力漸
向瘦弱

青皮

去穢

訶子皮

各四十兩

附子

炮去皮
臍十斤

肉桂

去粗皮五斤

肉豆蔻仁

麩裏煨令
熟一十斤

右為末每服三錢水一盞半生薑三片同煎七分食

前溫服

木香散治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下水穀不化臍
下疼痛腹中雷鳴胸膈痞悶脇肋虛脹及積寒久利腸
滑不禁肢體羸困不進飲食

丁香

木香

當歸

去蘆洗
焙

甘草

燼各二十
兩

附子

去皮臍醋炙
切片焙乾

肉豆蔻仁

炮

赤石脂

各十兩

藿香

葉洗焙
四十兩

訶子皮

十五兩

右為末每服一大錢水一盞半入生薑二片棗一個

同煎至六分溫服空心食前

神功九治三焦氣壅心腹痞悶六府風熱大便不通腰腿疼痛肩背刺疼頭昏面熱口苦咽乾心胃煩燥睡卧不安及治脚氣并素有風入大便秘結燥

大麻仁

別搗如膏

人參

各二兩

大黃

錦紋者麴裏煨

訶梨勒皮

各四兩

右為細末入麻仁搗研勻煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九溫水下溫酒米飲皆可服食後臨卧如大

便不通可倍丸數以利為度

麻仁丸順三焦和五藏潤腸胃際風氣治冷熱壅結津液耗少令人大便秘難或閉塞不通若年高氣弱及有風入大便秘澁尤宜服之

枳殼

去穰麴炒

白檳榔

煨半生

兔絲子

酒浸研末

山薺

防風

去叉枝

山茱萸

車前子

肉桂

去粗皮各一兩半

木香

羌活

各一兩

郁李仁

去皮別研

大黃

半蒸半生

麻仁

別搗研各
四兩

右為細末入研別藥勻煉蜜和丸如梧桐子大每服
十五丸至二十丸溫水下臨卧服之

脾約麻仁丸治腸胃燥澁津液耗少大便堅硬或秘不
通臍腹脹滿腰背拘急凡有風入大便結燥又治小便
利數大便因硬而不可者調之脾約此藥主之

厚朴

去粗皮薑
汁炒

芍藥

枳實

麴炒半
斤

杏仁

去皮尖炒
研

麻仁

別研各五
兩

大黃

蒸焙一
斤

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方
卷六

二十三

右六味搗篩蜜和丸如梧桐子大每服二十九臨卧
溫水下以大便通利為度未利再服

七聖丸治風氣壅盛痰熱結搏頭目昏重涕唾稠粘心
煩面黃舌乾口燥精神不爽夜卧不安腰背拘急胸膈
痞悶腹脇脹滿腰疼大便秘結小便赤澀

川芎

肉桂

去粗皮

木香

生

羌活

去蘆

檳榔

生各半兩

郁李仁

去皮

大黃

蒸焙一分兩

生用各

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸至二

十九溫熟水食後臨卧服嵐瘴之地最宜服更量藏

府虛實加減

七宣丸療風氣結聚宿食不消兼砂石皮毛在腹中及
積年腰脚疼痛冷如冰石脚氣衝心煩憤悶亂頭旋暗
倒肩背重痛心腹脹滿胸膈閉塞風毒腫氣連及頭腦
大便或秘小便時澀脾胃氣痞不能飲食脚轉筋掣痛
攣急心神恍惚眠卧不安等疾

柴胡

去苗洗

枳殼

燉

木香

各五兩

甘草

煨四兩

桃仁

煨去皮尖
六兩

大黃

麴裏煨
十五兩

訶梨勒皮

五兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸米飲下食
後臨卧服稍增至四五十丸取宣利為度覺病勢退
服五補丸不問男女老少並可服餌量虛實加減

七棗湯治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水穀不分腹
脇脹滿臍腹疼痛心下氣逆腹中虛鳴嘔吐惡下胃膈
痞悶困倦少力不思飲食

茴香

去土炒

川烏

炮去皮臍

縮砂

取仁各八兩

益智

去皮半斤

厚朴

去粗皮薑製一斤

乾薑

炮四兩

甘草

六兩

右件為粗末每服二錢水一盞入大棗七個擘破同煎至七分去查溫服食前空心服

胃風湯治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴疝痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度並宜服之

白朮

芍藥

當歸

去苗

白芍藥

人參

去蘆

肉桂

去粗皮

茯苓

去皮各等分

右為粗末每服二錢以水一大盞入粟米百粒餘同

煎至七分去查稍熱服空心小兒量力減之

半硫丸除積冷暖元藏溫脾胃進飲食治心腹一切痞
癖冷氣及年高風秘冷秘或泄瀉等並皆治之

半夏

湯洗七次
焙乾為細

硫黃

明淨好者研令極細用柳
木槌之殺逆

右等分以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻入

白內杵數百下如梧桐子大每服空心溫酒或生薑湯下十五丸至二十九婦人醋湯下

赤石脂散治腸胃虛弱水穀不化泄瀉注下腹中雷鳴及冷熱不調下利赤白腸滑腹痛遍數頻多脇肋虛滿胸膈痞悶肢體困倦飲食減少

赤石脂

煨

甘草

燉各五兩

縮砂仁

二十兩

肉豆蔻仁

麵煨熟四兩

右為末每服二錢溫粟米飲調下食前空心服

純陽真人養臟湯治大人小兒腸胃虛弱冷熱不調藏
府受寒下利赤白或便膿血有如魚腦裏急後重臍腹
疔痛日夜無度胸膈痞悶脅肋脹滿全不思食及治脫
肛墜下酒毒便血諸藥不效者並皆治之

人參

當歸

去蘆各六錢

肉豆蔻

煨麴裹半兩

白朮

焙六錢

肉桂

去粗皮

甘草

炙各八錢

白芍藥

一兩六錢

苓香

不見火一兩六錢

訶子

去核一兩二錢

瞿粟殼

去蒂蓋蜜炙三兩六錢

右件剉為粗末每服二大錢水一盞半煎至八分去
查食前溫服老人孕婦小兒暴瀉急宜服之立愈忌
酒麪生冷魚腥油膩如藏府滑泄夜起久不瘥者可
加炮了附子三四片煎服此藥的有神效不可具述

下方不用肉豆蔻

感應丸治證并方見一切氣類大已寒丸治證并方見
傷寒類

御米湯治久患痢疾或赤或白臍腹痛裏急後墜發

歇無時日夕無度及下血不已全不入食並皆主之

厚朴

去粗皮炒
薑製十兩

罌粟殼

蜜炙

白茯苓

去皮

甘草

炙各五兩

人參

去蘆

乾薑

炮各二兩半

右咬咀無每服三錢水一盞半生薑三片大淮棗三

枚烏梅一個煎至一盞去查空心食前通口服如年

老及七八十歲每服二大錢小兒每服一錢半依煎

法煎更量兒歲加減

地榆散治腸胃氣虛冷熱不調泄瀉不止或下鮮血或

如豆汁或如豚肝或膿血相雜赤多白少腹痛後重遍
數頻併全不入食並宜服之

又方見後

石榴皮

蓮蓬

去莖

罌粟殼

去穢蜜
塗炙

甘草

炒各
等分

右為細末每服一大錢水一盞半生薑三片煎至一
盞通口服不拘時候

金粟湯治丈夫婦人室女小兒一切下利無問新久冷
熱不調日夜無度臍腹絞痛即痢肢體困倦小便開澀
不思飲食漸加羸瘦又治傷生冷脾胃怯弱飲食不消

腹脹雷鳴泄瀉不止連月不瘥並宜服之

陳皮

去白
半斤

車前子

炒四兩

乾薑

炮二兩

甘草

炒

罌粟殼

去穰蒂蜜炒各
半斤

右為末每服二大錢水一盞棗一個生薑二片煎至
七分空心食前稍熱服或飯飲調下亦得忌生冷油
膩魚鯉鮓蟹等

育腸丸治腸胃虛弱內挾生冷腹脹泄瀉時時刺痛裏
急後重下利赤白或變膿血晝夜頻併經久不愈

烏梅肉

黃連

去鬚各一分

訶子皮

罌粟殼

去蓋筋蜜炙

肉豆蔻

包溫紙裏煨各半兩

當歸

去蘆酒浸一宿焙一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸空心食前飯飲下如小兒作小丸煎甘草乾薑湯下

腸風熏散治榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟府之內或食生冷或啖炙博或飲酒過度積熱腸間致使腸胃虛弱

糟粕不聚大便秘鮮血臍腹疼痛裏急後重或肛門脫出
或久患酒利大便頻併並皆療之

敗掇

燒

木饅頭

燒

烏頭

去核

甘草

炙各二兩

右為細末每服二錢水一盞煎至七分空心溫服

斗門散治八種毒利藏府撮痛膿血赤白或有五色相
雜日夜頻併兼治禁口惡利裏急後重大渴不止酒利
臟毒全不進食

又方見後

乾葛

去皮半斤

地榆

去蘆

甘草

炙各二兩

乾薑

炮

當歸

去蘆各一兩

黑豆

炒去

罌粟殼

去穢蜜炙各四兩

右為細末每服二錢水一盞煎至七分溫服不拘時

候

水蘖木香丸治一切赤白膿血相雜裏急後重或藏府

滑泄日夜無度或積寒久冷臍腹疼痛不思飲食

又方見後

當歸

洗去蘆

訶子

炮去核

木香

不見火各六兩

青皮

去白

甘草

燉亦各二兩四錢

罌粟殼

去穢二兩

錢八

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一九水八分盞煎至六分食前空心溫服

大斷下丸治臟腑停寒腸胃虛弱腹痛泄瀉全不思食

高良薑

去蘆

赤石脂

研

乾薑

炮

龍骨

研各一兩半

肉豆蔻

麝裏煨

牡蠣

火煨

附子

炮去皮臍

白礬

枯

訶子

煨去核各一兩

細辛

去上葉七分半

酸石榴皮

去穢米醋浸一宿取出炙令焦黃色

右為末醋煮麴糊為丸如梧桐子大每服五十九空

心溫米飲下

狗頭骨丸治久患下利臍腹疼痛所下雜色晝夜不止
或其人久虛頻下腸垢謂之惡利並能治之

赤石脂

敗龜 燒存性

乾薑 各半兩

肉豆寇 麩裏煨

附子 炮去皮各一兩

狗頭骨 一具火燒

存性取末

一兩

右為末醋糊丸如梧桐子大每服五七十九米飲空

心下

水煮木香九治證與煎水煮木香九同

陳皮

去白

甘草

炒

青皮

去白

木香

各一兩一分

白芍藥

當歸

去蘆各二兩

乾薑

炮一兩半

訶子皮

去核二兩半

罌粟殼

去蒂蓋蜜

炒黃色
八兩

右為細末煉蜜九每一兩作六丸每服一九水一盞
煮至七分和查空心溫服不拘時亦可

大香連丸治丈夫婦人腸胃虛弱冷熱不調泄瀉煩渴

米穀不化腹脹腸鳴胸膈痞悶脅肋脹滿或下利膿血
裏急後重夜起頻數不思飲食或小便不利肢體怠惰
漸即瘦弱並宜服之

黃連

去蘆鬚二十兩用茱萸十兩
同炒令赤色去茱萸不用

木香

不見火
四兩八

錢八
分

右件為細末醋糊為丸如梧桐子丸每服二十九飯
飲吞下空心食前日進二三服

戊巳丸治脾受濕氣泄利不止米穀遲化臍腹刺痛小

兒有疳氣下利亦能治之

黃連

去鬚

吳茱萸

去梗炒

白芍藥

各五兩

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服二十九膿煎

米飲下空心日三服

痢聖散子治丈夫婦人遠年近日赤白休息等痢

又方見後

當歸

去蘆

乾薑

炮各二兩

黃柏皮

去粗皮

甘草

燼

罌粟殼

去蒂膜

枳殼

去穢

御米

即罌粟子性與殼同

右剉為粗散每服三錢水一盞半薤白二條擘碎同煎至八分去查食前稍溫服老人小兒加減服食忌生冷油膩之物

豆附丸治丈夫婦人腸胃虛弱內受風冷水穀不化泄瀉注下腹痛腸鳴手足逆冷服諸藥不效者此藥主之

肉豆蔻

炮

附子

炮去臍各四兩

乾薑

炮

木香

不見火

白茯苓

焙

肉桂

去粗皮各二兩

丁香

不見火一兩

右為細末薑汁麵糊為丸如梧桐子大每服五十九至一百丸用生薑湯吞下粥飲亦得空心食前進

溫中丸治脾藏傷冷宿食不消霍亂吐瀉心腹膨脹攻刺疼痛

良薑

去蘆

乾薑

炮

青皮

去白

陳皮

去白各五兩

右為細末用醋打麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸米飲吞下不拘時候又療丈夫小腸氣疝塊疔痛炒茴香少許細嚼用鹽湯鹽酒任下日進二服

肉豆蔻散治脾胃氣虛腹脇脹滿水穀不消藏府滑瀉
腹內虛鳴困倦少力口苦舌乾不思飲食日漸瘦弱並
宜服之

蒼朮

米泔浸一宿去皮焙
八兩

茴香

炒

肉桂

去粗皮

川烏

炮去皮臍

訶子皮

各二兩

乾薑

炮

厚朴

炒去粗皮

陳皮

去白

肉豆蔻

麴裏煨

甘草

兩 燻各四

右為末每服二錢水一盞生薑二片棗子一個煎七

分溫服

神應黑玉丹治丈夫婦人久新腸風痔漏著牀頭痛不可忍者服此藥不過三四次便見功效初得此疾發痒或疼穀道周回多生硬核此是痔如破是痿只下血是風皆因酒色氣風食五事過度即成此疾人多以外醫塗治病在腸自有蟲若不去根本其病不除此藥的有功效

刺蝟皮

劉十六兩

猪懸蹄

二百個

牛角腮

劉十二兩

槐角

六兩

雷丸

脂麻

各四兩

亂髮

皂角水淨
洗焙八兩

敗椶

剉八兩

苦楝根

五兩

右剉碎用瓷罐內燒存性碾為細末入乳香二兩麝香八錢研令和勻用酒打麵糊為丸如梧桐子大每服八粒先細嚼胡桃一個以溫酒吞下空心晚食前日二服如病甚日三服切忌別藥不過三兩日永除根本

罌粟湯治腸胃氣虛冷熱不調或飲食生冷內傷脾胃

或飲酒過度臍腹疼痛泄瀉腸鳴下痢或赤或白裏急後重日夜頻併飲食減少及腸胃受濕膨脹虛鳴下如豆汁或下鮮血並治之

艾葉

去梗

黑豆

炒去皮

陳皮

去白

乾薑

炮

甘草

炙各二兩

罌粟殼

去蒂蜜炙四兩

右件剉為粗散每服三錢水一盞半煎至一盞去查溫服食前忌生冷油膩毒物小兒量歲數加減與之固腸散治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水穀不分冷

熱不調下利膿血赤少白多或如魚腦腸滑腹痛遍數
頻併心腸脹滿食減少力並宜服之

陳米

炒二十兩

木香

不見火一兩

肉豆蔻

生用

乾薑

炮

甘草

炙各二兩半

罌粟殼

生帶蓋蜜

炙二

兩

右件為細末每服二錢酒一盞生薑二片棗一枚同
煎至七分溫服不計時候如不飲酒水煎亦得忌酒
麴魚腥等物

麴朮丸治時暑暴瀉壯脾溫胃進美飲食及療飲食所傷胸膈痞悶

神麴

炒

蒼朮

米泔浸一宿焙乾各等分為末

右末麴糊為丸如梧桐子大每服三十九不拘時米飲吞下

纏金丹治大人小兒一切瀉利無問冷熱赤白連綿不差愈而復發腹中疼痛者宜服之

礞砂

乳香

各二錢半

砒霜

醋煮煨二錢半

杏仁

去皮尖八錢半

黃蠟

硃砂 各一兩

白膠香 一錢

木鼈 半兩

黃丹 二兩半

巴豆

去皮心膜出油八錢半

右件研為細末，銕化澁和為丸，如麻子仁大。每服一丸，小兒半丸。水瀉新汲水下，赤利甘草湯下，白利乾薑湯下，赤白利甘草乾薑湯下，並放冷，臨卧服。孕婦莫服，忌熱物一二時辰。

縛虎丸治休息利，經一二年不瘥，羸瘦衰弱，兼治脾腰。

疼痛

砒

成塊好者

黃蠟

各半兩

右將黃蠟鎔開下砒以柳條七箇逐箇攪頭焦即換
俟用足取起旋丸如梧桐子大每服一九痢冷水下
脾疼亦然腰痛冷酒下并食前小兒丸如黍米大每
服一九湯使同上

遇仙立效散治諸般惡利或赤或白或濃淡相雜裏急
後重臍腹絞痛或下五色或如魚腦日夜無度或噤口

不食不問大人小兒虛弱老人產婦並宜服之

御米殼

去蒂蓋
炒黃

川當歸

洗

甘草

各二兩

赤芍藥

酸榴皮

地榆

各半兩

右為粗末散每服三錢水一盞半煎至七分空心溫服小兒量歲數加減以差為度忌生冷油膩腥臊等物

三神丸治清濁不分泄瀉不止注下或赤或白臍腹痛裏急後重並宜服之

草烏

三枚各去皮尖一生
一炮一燒作灰用

右為細末醋糊丸如蘿蔔子大大人五七九小兒三
丸水瀉倒流水下赤利甘草湯下白利乾薑湯下

地榆散治大人小兒脾胃氣虛冷熱不調下利膿血赤
多白少或因腸胃乘虛為熱毒所滲下利純血臍腹痛
痛裏急後重口燥煩渴小便不利純下鮮血或先經下
利不應服熱藥而誤服熱藥蘊毒不散積於腸間滲而
成血者並宜服之

地榆

炒

乾葛

各半斤

赤芍藥

茯苓

去皮各六兩

乾薑

炮二兩

當歸

去苗三兩

罌粟殼

蜜炒十二兩

甘草

炙四兩

右搗羅為細末每服二錢用溫熱水調下不拘時候
小兒三歲可服半錢更量歲數加減與之若下利純
白或下紫黑血腸滑不禁者不可服之

秘傳斗門散治八種毒利藏府撮痛膿血赤白或下瘀
血或成片子或有五色相雜日夜頻併兼治禁口利惡

裏急後重久渴不止全不進食他藥不能治者立見神效

黑豆

炒去皮十兩

乾薑

炮四兩

罌粟殼

蜜炒半斤

地榆

炒

甘草

炙各六兩

白芍藥

三兩

右為細末每服二錢水一盞同煎至七分溫服

丁香豆蔻散治脾胃虛弱宿寒停積或飲食生冷內傷脾胃泄瀉注下水穀不化胸滿短氣嘔逆惡心臍腹疼痛脇肋脹滿腹內虛鳴飲食減少及積寒久利純白或

白多赤少日夜無度或脾胃虛寒泄瀉日久愈而復發者並宜服之

京三稜

炮

木香

不見火

厚朴

去粗皮薑汁製

芍藥

肉豆蔻

炮

人參

茯苓

白者去皮

乾薑

炮各五兩

吳茱萸

湯七次焙

甘草

炙

丁香

各二兩半

蒼朮

去皮七兩

右為細末每服三錢水一盞薑三片棗一個擘破同煎至八分空心食前溫服如不及煎入鹽少許湯點

服亦得

萬金飲治脾胃虛弱內受風寒或飲食生冷傷於脾胃
嘔吐泄瀉臍腹痛脇肋脹滿腸內虛鳴及腸胃受濕
膿血相雜下如豆汁或下瘀血裏急後重日夜無度飲
食減少漸至瘦弱並能治之

陳皮 去白

甘草 半生半炙

罌粟殼 去蒂
蓋半

生半蜜炙
各等分

右為粗末每服四錢先用沸湯泡中熱又於碗內盛

重湯入盞在內却抄藥末在中內用沸湯泡至七分
盞上用盞蓋之良久紗綿濾去渣空心食前溫服
如神止瀉丸治藏府虛寒脾胃受濕泄瀉無度腸鳴腹
痛不進飲食漸至羸瘦並宜服之

半夏

湯泡七次
去滑

蒼朮

米泔浸去黑皮焙乾各半
斤

川烏

米泔浸去軟皮切作片焙乾用薑四兩同炒
黃色為度去薑不用淨稱四兩

右為細末薑汁糊為丸如梧桐子大每服五十丸空
心食前飯後飲吞下

神效參香散治大人小兒藏氣虛怯冷熱不調積在藏
府作成利疾或下鮮血或如豆汁或如魚腦或下瘀血
或下紫黑血或赤白相雜或成五色裏急後重日夜頻
併臍腹絞痛甚不可忍及噤口瘡蟲時瘟諸利無問新
舊並能治之

白扁豆炒

人參

木香各二兩

茯苓去皮

肉豆蔻去皮各四兩

陳皮去白十兩

罌粟殼去蒂十兩

右為細末每服三大錢用溫米飲調下不拘時候立見神效

黃耆湯治年高老人大便秘澀

綿黃芪

陳皮

去白各半兩

右為細末每服三錢用大麻仁一合爛研以水投取漿一盞漚去滓於銀石器內煎候有乳起即入白蜜一大匙再煎令沸調藥末空心食前服秘甚者不過兩服愈常服即無秘澀之患此藥不冷不燥其效如

神

痢聖散子治證同前

草果

去皮

石菖蒲

去毛

白茯苓

麻黃

去根節

厚朴

薑汁炙

獨活

枳殼

麩炒

藿香

白朮

細辛

洗去葉

吳茱萸

去梗

甘草

燉

木猪苓

去皮

蒼朮

浸

良薑

去蘆

赤芍藥

附子

炮去皮臍

藁本

去蘆

柴胡

去蘆

澤瀉


防風

去蘆

半夏

炙各等分

右剉為粗散每服三錢水一盞半薤白二條擘碎同煎至八分去查食前稍溫服大人小兒加減服食忌生冷油膩之物



欽定四庫全書

太平惠民和劑局方
卷六

四十三

太平惠民和劑局方卷六

欽定四庫全書

子部

太平惠民和劑局方卷八

詳校官太醫院吏目臣吳尊爰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣左顥若

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方卷七

宋 陳師文等 撰

治眼目疾

錦鳩丸治肝經不足風邪內乘上攻眼暗淚出怕日羞明隱澀痒痛瞻視茫茫多見黑花或生翳膜並皆治之

草決明子

麤仁

去皮

羌活

去蘆

瞿麥

各三兩

杜蒺藜

炒去尖角

牡蠣

洗火燉取粉

黃連

去鬚

細辛

去苗

甘菊花 淨

肉桂 去粗皮

防風 去蘆各五兩

茯苓 去皮四兩

斑鳩

一隻去皮毛腸嘴爪用文武火連骨炙乾

羯羊肝

一具薄批炙令焦

蔓菁子

二升淘洗絹袋盛飯甑蒸一伏時日乾

右十五味為末煉蜜和杵五百下丸如梧桐大每服十五丸至二十丸以溫水或溫酒下空心日午臨卧日三服如久患內外障眼服諸藥未效者漸加服五十丸必效暴赤眼疼痛食後用荊芥湯下二十丸

駐景丸治肝腎俱虛眼常昏暗多見黑花或生障翳視

物不明迎風有淚久服補肝腎增目力

車前子

熟乾地黄

酒洗淨酒蒸
焙各三兩

兔絲子

酒浸別研
為末五兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下
空心晚食前日二服

密蒙花散治風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明臉生風粟
隱澀難開或痒或痛漸生翳膜視物不明及久患偏頭
疼牽引兩眼漸覺細小昏澀隱痛並暴赤腫痛並皆療

之

密蒙花淨

石決明

用鹽同東流水煮一伏時漉出研粉

木賊

杜蒺藜

炒去尖

羌活

去蘆

菊花

去土各等分

右為細末每服一錢臘茶清調下食后日二服

羚羊角散治大人小兒一切風熱毒上攻眼目暴發赤腫或生眼瘡疼痛隱澀羞明

羚羊角

鎊

黃芩

升麻

甘草

炙

車前子

各十兩

梔子仁

草龍胆

各五兩

決明子

二十兩

右為末每服一錢食后溫熱水調下日進三服小兒
可服半錢

秦皮散治大人小兒風毒赤眼腫痛痒澀眵淚昏暗羞
明

秦皮

滑石

桂府者
搗碎

黃連

去鬚各
十兩

右為細末每用半分沸湯泡去滓溫熱頻洗

鎮肝丸治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗痒痛隱
澀難開推眵多淚怕日羞明時發腫赤或生障翳並宜

服之

蔓荊子

去白皮

地膚子

人參

菟蔚子

決明子

炒

白茯苓

去皮

防風

去蘆又

遠志

去心各一兩

青箱子

地骨皮

去土

柴胡

去蘆

山藥

車前子

栢子仁

炒

玄參

甘菊

甘草

炙各半兩

細辛

去苗一分

右為末蜜水煮糊丸如梧桐子大每服二十丸米飲下食後日二服

菊花丸治肝腎不足眼目昏暗瞻視不明茫茫漠漠常見黑花多有冷淚久服補不足強目力

枸杞子

三兩

巴戟

去心一兩

甘菊花

揀四兩

薤蓉

酒浸去皮炒切焙二兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸溫酒或鹽湯下空心食前服

菩薩散治男子女人風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明臉背腫痒或時赤痛耳鳴頭眩

荊芥穗

一兩半

防風

劉炒二兩

甘草

炒一兩

蒼朮

劉炒

米泔浸

一宿

去皮

白蒺藜

炒各二兩

右並為細末不拘時入鹽少許沸湯或酒調下神妙
撥雲散治男子婦人風毒上攻眼目昏暗翳膜遮障怕
日羞明多生熱淚隱澀難開眶痒赤痛臉背紅爛瘡肉
侵睛但是一切風毒眼疾並皆治之

羌活

防風

柴胡

甘草

炒各一斤

右為末每服二錢水一盞半煎至七分食後臨睡時

服薄荷茶調菊花苗湯下亦得忌藏鹽鮓醬濕炙燂
發風毒等物

草龍胆散治上焦受於風熱氣毒攻衝眼目暴赤隱澀
羞明腫痛多眵迎風有淚翳膜攀睛胬肉隱痛並治之
又方見後

川芎

不見火

香附

炒去毛
各四兩

龍胆草

洗去
蘆

甘草

炙

草決明子

微炒

木賊

洗淨去
節

菊花

去梗各
二兩

右為細末每服二錢用麥門冬熟水入砂糖少許同

調食後服或米泔調服亦得食後或臨時服之

蟬花散治肝經蘊熱風毒之氣內搏上攻眼目翳膜遮
暗赤腫疼痛昏暗視物不明隱澀難開多生眵淚內外
障眼

蟬蛻

洗淨去土

穀精草

洗去土

白蒺藜

炒

菊花

去梗

防風

不見火

草決明

炒

密蒙花

去枝

羌活

黃芩

去土

蔓荊子

去白皮

山梔子

去皮

甘草

炒

川芎

不見火

木賊草

淨洗

荊芥穗

各等分

右為末每服二錢用茶清調服或用荊芥湯入茶少許調服亦得食後及臨卧時服

春雪膏治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗痒痛隱澀難開昏眊赤腫怕日羞明不能遠視迎風有淚多見黑花並皆療之

腦子

研二錢半

蕤仁

去皮殼壓去油二兩

右用生蜜六錢重將腦子蕤仁同波和每用銅筋子或金銀釵股大小背時復少許點之及治連眶赤爛

以油紙塗藥貼

流氣飲治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗視物不明常見黑花當風多淚怕日羞明推眇赤腫隱澀難開或生障翳倒睫拳毛眼眩赤爛及婦人血風眼及時行暴赤腫眼眼胞紫黑應作眼病並宜服之

大黃

炮

川芎

牛旁子

炒

菊花

去枝

細辛

去苗

防風

去苗

白蒺藜

炒去刺

山梔

去皮

黃芩

去蘆

甘草

炙

蔓荊子

去白

玄參

去蘆

荊芥

去梗

木賊

去根節
各一兩

蒼朮

浸一宿炒
熱二兩

草決明

一兩半

右搗羅為末每服二錢半臨卧用冷酒調下如嬰兒有患只令乳母服之

洗肝散風毒上攻暴作赤目腫疾難開隱澀眵淚昏暗羞明或生翳膜並皆治之

當歸

去蘆

薄荷

去梗

羌活

去蘆

防風

去蘆

山梔仁

甘草

炙

大黃

煨

川芎

各二兩

右為末每服二錢冷水或熟水調下食後日服見效

菊花散理肝氣風毒眼目赤腫昏暗羞明癰澀難開攀睛瘀肉或痒或痛漸生翳膜及治暴赤腫痛悉皆治之

白蒺藜

炒去刺

羌活

去蘆不見火

蟬蛻

去頭足翅各三兩

木賊

去節三兩

菊花

去梗六兩

右為細末每服二錢食後臨卧茶清調下常服明利頭目薰洗去風忌發風淹藏炙燂等物

明暗散能治外障退翳膜燎風毒上攻眼疼赤腫或臉皆痒爛時多熱淚昏澀

赤芍藥

當歸

去蘆
洗焙

黃連

去鬚

滑石

細研

右件各五兩剉碎碾為細末入研滑石拌勻每用半
錢沸湯點澄清去查熱洗忌一切淹藏魚鮓酒麪等
毒物

蟬化無比散治大人小兒遠年近日一切風眼氣眼攻
注眼目昏暗臉生風粟或痛或痒漸生翳膜侵睛遮障
視物不明及久患偏正頭風牽搐兩眼漸漸細小連眶
赤爛及小兒瘡疹入眼目膜遮睛赤澀隱痛並皆治之

常服祛風退翳明目

蛇蛻

微炙
一兩

蟬蛻

去頭足
翅二兩

羌活

當歸

洗焙

石決明

用鹽同東流水煮一
伏時漉出搗研如粉

川芎

各三
兩

防風

去叉枝

茯苓

去皮

甘草

炙各
四兩

芍藥

赤者
十三

兩

蒺藜

炒去刺
半斤

蒼朮

浸去皮炒
十二兩

毒等物

右為末每三錢食後米泔調服茶清亦得忌食發風
明目地黃丸治男子婦人肝藏積熱肝虛目暗膜入水

輪漏睛眇淚眼見黑花視物不明混睛冷淚翳膜遮障及
腎藏虛憊肝受虛熱及遠年近日暴熱赤眼風毒氣眼
並皆治之魚治乾濕脚氣消中消渴及諸風氣等疾由
腎氣虛散者但服此能補肝益腎驅風明目其效不可
具述

生乾地黄

洗焙

熟乾地黄

洗焙各一斤

牛膝

去蘆酒浸三兩

枳殼

去穰炒

防風

去蘆又各四兩

杏仁

去皮尖麩炒黃細研去油二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心

食前溫酒吞下或用飯飲鹽湯亦得忌一切動風毒等物

洗眼紫金膏治遠年日近翳膜遮障攀睛努肉昏暗淚多瞻視不明或風氣攻注臉生風粟或連眶赤爛怕日羞明隱澀難開並能治之

硃砂

別研

乳香

別研

硼砂

別研

赤芍藥

當歸

洗焙各一分

雄黃

研飛二錢

麝香

別研半錢

黃連

去鬚半兩

右搗羅為細末入研藥拌勻再搗煉蜜溲和為丸如

皂莢子大每次用一丸安淨盞內以沸湯泡開於無風處洗藥冷閉目少時候三兩時再煨令熱依前洗一貼可洗三五次不得犯銅鐵器內洗如暴赤眼腫者不可洗之

草龍胆散治眼暴赤腫痛風氣熱上衝睛疼連眶臉皆赤爛疼痛瘀肉侵睛時多熱淚及因叫怒逆損肝氣久勞瞻視後損眼凡風砂塵土入眼澀痛致成內外障翳及一切眼患悉皆治之

疾藜子

炒去刺

草龍胆

各六兩

赤芍藥

半斤

甘草

炙

羌活

防風

去文枝各三兩

菊花

去枝半兩

茯苓

去皮四兩

右搗為末每服二錢食後臨卧時溫酒調下

湯泡散治肝經不足容熱風壅上攻眼目赤澀睛疼臉爛怕日羞明夜卧多淚時行暴赤兩太陽穴疼頭旋昏眩視物不明漸生翳膜並皆治之

赤芍藥

當歸

洗焙

黃連

去鬚

右等分搗羅為細末每用二錢極滾湯泡乘熱燻洗

冷即再溫洗一日三五次洗以差為度忌淹藏毒物

其說去凡眼目之病皆以血凝滯使然故以行血藥
合黃連治之血得熱即行故乘熱洗用無不效驗

還睛丸治男子女人風毒上攻眼目赤腫怕日羞明多
饒眵淚隱澀難開眶痒赤痛臉皆紅爛瘀肉侵睛或患
暴赤眼睛疼不可忍者併服立效又治偏正頭痛一切
頭風頭目眩暈皆治之

白朮

生用

兔絲子

酒浸
別研

青箱子

去土

防風

去蘆

甘草

炙

羌活

去苗

白茯苓

炒去

蜜蒙花

木賊

去節

右各等分為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼白湯吞下空心食前日三服

曾青散治一切風熱毒氣上攻兩眼多生眵淚怕日羞明隱澀難開眶爛赤腫或痒或痛及時行暴赤眼睛昏澀痛悉皆治之

白薑

炮

防風

去蘆各一兩

蔓荊子

去皮二兩

曾青

四兩

右為細末每用少許末搐入鼻中立有功效

秘傳羊肝丸治丈夫婦人肝經不足風毒上攻眼目昏
暗淚出羞明怕日隱澀難開或痒或痛又治遠年日近
內外障眼攀睛弩肉箴刮不能治者此藥治之

白羊子肝

一具淨洗去膜

黃連

去鬚搗羅為末

右將羊肝先入沙盆內杵爛旋吹入黃連末拌搗乾
濕得所為丸如梧桐子大每服十四丸食後以溫漿
水吞下連作五劑差但是諸般眼疾及障翳青盲者
皆主之禁食猪肉及冷水

治目方用黃連者多矣此方最為奇異堯禹錫云有

崔承元者因官治一死罪因而活出之囚後數年以病自致死一旦崔忽為內障之苦喪明逾年後半夜屏息獨坐時聞階除間悉窅之聲崔問為誰曰是昔所蒙活囚今故報恩至此遂以此方告崔而沒此方合服不數月眼復明因傳此方於此

治咽喉口齒

龍舌散治大人小兒上膈壅毒口舌生瘡咽喉腫塞疼痛妨悶每用少許滲貼患處嚥津小兒瘡疹毒氣攻口齒先用五福化毒丹掃後仍再用此藥滲貼立效

硃砂

研飛二兩半

寒水石

燒赤二斤

生腦子

研二錢半

右為末每日五七次用夜卧滲貼妙

如聖湯治風熱毒氣上攻咽喉咽痛喉瘡腫塞妨悶及肺壅欬嗽咯唾膿血胃滿振寒咽乾不渴時出濁沫氣息腥臭久久吐膿狀如米粥又治傷寒咽痛

苦桔梗

炒一兩

甘草

炒二兩

右為粗末每服二錢水一盞煎至七分去渣溫服小兒時時呬服食後臨卧

硼砂丸治大人小兒風壅膈熱咽喉腫痛舌頰生瘡口

乾煩渴

麝香

研二兩

梅花腦

別研三分

甘草

浸汁熬膏十兩

牙硝

枯研二兩

硼砂

研十兩

寒水石

燒通赤紅五十兩

右為末用甘草膏子和溲每兩作四百丸每服一丸

含化嚥津常服化痰利膈生津止渴

麝臍散治牙齒動搖風蟲疼痛斷肉宣露涎血臭氣常

用令牙齒堅牢解骨槽毒氣

牛膝

去蘆十斤

木律

四十四兩

黃茹

細切二十個

郁李仁

二十兩

麝香空皮子

細對一百個

已上五味搗碎入罐子內上用瓦子蓋口留一小竅用鹽泥固濟燒令通赤候烟白色即住火取出以新土罈一伏時取出後入下項藥

升麻

細辛

去苗各十斤

右件為細末每用少許揩患處須臾溫水漱口臨卧更貼少許嚥津亦無妨

玉屑无憂散治咽喉腫痛舌頰生瘡風毒壅塞熱盛喉

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方
卷七

古

閉或因悞吞硬物諸骨鯁刺涎滿氣急或至悶亂不省人事並皆療之

玄參

去蘆

荊芥穗

滑石

研

黃連

去毛

縮砂

去殼

白茯苓

炒令黃

貫衆

去蘆

甘草

炙

山豆根

各一兩

寒水石

硼砂

二錢

右為細末每服一錢乾滲舌上後以新水嚥下不拘時候

如聖勝金鉗治急喉閉纏喉風飛颺單蛾雙蛾結喉重

舌木舌腮頤腫痛屢經用藥不能吞水粥者

又方見後

硫黃

細研

川芎

臘茶

薄荷

去枝梗

川烏

炮

硝石

研

生地黃

各二兩

右為細末用生葱自然汁波和為錠每服先用新汲水灌漱吐出次嚼生薄荷五七葉微爛用藥一錠同嚼極爛以井水嚥下甚者連進三服即愈重舌腮腫先服一錠次以一錠安患處其病隨藥便消又治冒暑伏熱不省人事用生薄荷水調研一錠灌下即甦

如行路常含一銚即无伏熱之患口舌生瘡不能合
口并食熱物如上法服訖用水漱灌嚼薄荷十片如
泥吐出再水灌漱嚼藥一銚含口內聚涎裏之覺涎
滿方吐出如此服三銚便能食酒醋遇食鹽酸鮓脯
炙煨喉中生泡須掐破吐血方省薄荷數葉以一銚
同嚼井水吞下砂淋熱淋小便出血同車前草七葉
生薑小塊研爛水調去查嚼藥一銚以水送下此藥
分陰陽去風熱化血為涎化涎為水常帶隨身備急

一銚可活一命小兒只服半銚

硼砂散治大人小兒年患喉痺閉塞不通腫痛生瘡語聲不快風壅痰毒鼻衄出血

山藥

生六斤

腦子

研七兩

牙硝

生二十四兩

麝香

研四兩

甘草

硼砂

生各二十兩

右為細末每服半錢如茶點服

草烏散治風牙蟲牙攻注疼痛晝夜不止痛不可忍睡卧不安牙斷宣露動搖欲脫或腮頰浮腫斷爛血出並

能療之

良薑

去蘆

草烏

去皮

細辛

去土藥

荊芥

去梗

右件四味各二兩碾為末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得吞嚥良久用溫鹽湯灌漱其痛即止常使揩牙用腐炭末一半相和常用止牙宣辟口氣永無牙疾

吹喉散治三焦大熱口舌生瘡咽喉腫塞神思昏悶並能治之

蒲黃

一兩

盆硝

八兩

青黛

一兩半

右件用生薄荷汁一升將盆硝青黛蒲黃二處用瓷
罐盛慢火熬乾研細每用一匙或半錢滲於口內良
久出涎吞之不妨或喉中腫痛用筒子入藥半錢許
用力吹之无不立效

如聖勝金鋌治證服餌與前如聖勝金鋌同品味小異

朴硝

四兩

川芎

一兩

硫黃

細研二貫衆二兩
兩半

薄荷

藥

荊芥

穗

嫩茶

各半兩

右件為末裂生葱自然汁漉和為銚服藥湯使如前方

五香散治咽喉腫痛諸惡氣結塞不通急宜服之

木香

沉香

鷄舌香

各一兩

麝香

研二分

薰陸香

一兩

右搗羅為末入麝香研令勻每服二錢水一中盞煎至六分溫服不拘時候

如神散治風牙蟲牙攻疰疼痛日夜不止卧睡不安或

牙斷動搖連頰浮腫不拘久近並皆治之

川椒

去目及閉口者
微炒出汗用

露蜂房

微炙

右搗羅為細末每用一錢水一盞入鹽少許同煎至
八分乘熱漱之冷即吐出一服立效

玉池散治風蛀牙疼腫痒動搖牙齦潰爛宣露出血口
氣等疾

當歸

去蘆

藁本

升麻

防風

白芷

槐花

炒

川芎

甘草

炙

細辛

去苗

地骨皮

各等分

右為末每用少許指牙痛甚即取二錢水一盞半黑豆半合生薑三片煎至一盞稍溫漱口候冷吐之

荊芥湯治風熱肺壅咽喉腫痛語聲不出或如有物哽

荊芥穗

半兩

桔梗

二兩

甘草

炙一兩

右粗末四錢水一盞薑三片煎六分去渣食後溫服
細辛散治風蟲牙疼牙斷宣爛牙齒搖動腮頰浮腫皆
能治之

紅椒

去目炒

鶴蝨

牙皂

各半兩

白芷

二兩

縮砂

去壳半兩

荊芥

去梗

細辛

去苗各一兩

草烏

二兩

草撥

古方治牙疼為要藥半兩

右搗為細末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得
嚥少時用溫水漱口頻頻擦之立有功效

欽定四庫全書

太平惠民和劑局方
卷七

太平惠民和劑局方卷七